



MUSEO

NACIONAL

Año 1818

Abril 23

• Malvabisco en la costa del mar

Malva Hibica mar submaritima. — foliis subcor-
dati, inferioribus 9. lobis pubescentibus, serratis, canle
fructuoso cum petiolis, pedunculisque aculeato, calice ex-
teriori decaphyllo, glabro, ex interiori hispido.
Sp. nov.

Se cria en la costa hacia mar adentro de la Esplanada
no es comun. Es una planta de mar de vara de ra-
mos muy abiertos y leñosos, rojos y toda ella en
agujeros, ^{y lampiñas} Las hojas inferiores son de 9 lobos al-
go agudos y oblongos p. lo comun. y tendran
unas 4-5 pulgadas: los peciolo ~~rojos~~ y algo
menores que ellas, con estípulas cerasas: los pe-
dunculos de las axilares superiores, robustos, menores
que los peciolo, y solitarios y unifloros: la flor
es con las corolas rojas y grandes de tres
pulgadas o mas: las capulas con los celosillos poli-
spermas: el caliz exterior de 10 hojuelas alternas y
lampiñas la mitad mas corto que el interior 9 fids.

8181 vint

22 June 1900

• 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523.

[The page contains faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side.]

Año 1818. Mayo - Historia nat.

Insecto de antenas bipartidas.
Sistema de Latreille

Pteroscira - Ordo V hymenoptera: tribus 1.ª Terebrantes. Sectio 1.ª
Phagtophaga Pupophaga: familia V. Diptoleporia.

Tetracera .g. n.

Antenna filiformes bipartita, recta thoraci aequalis, articulis indistinctis granulosis; abdomen sessile. oratum

Fetr. Latreille: nigra, ~~tibia~~ femoribus tibiisque flavis ^{antennis.} plumosis.

Habitat ^{spe. y ting.} in gallis: et molle? forma magnitudineque culicis: ala corpori subaequalis, inferioribus paulo brevioribus, nitidis, obscure calicatis.

Stigmata 3. in medio: antenna interseculor: articulo basilaris crasso ex quo duo rami plumosi; multianticularis? Capta in Manga: tibia ^{et cymipie} differat antennae non retractis et utraque ad basim partit:

Mayo 16

Cochinilla

Coccus molino: fusca punctis 9 tomentoso-albis, segmentis indistinctis.

Se encuentra una planta suffruticosa de hojas alas con impar y decurrentes por el peciolo común que nunca he podido ver en flor pero que me parece una especie de molino. Toda la planta principalmente las ramitas y peciolos comunes: las mas pequeñas son como cabezas en alfiler, y después se hinchaban en quatro o cinco mas en forma globosa. En Per un ligero ensayo amate las y recandolas al fuego en una cucharita de plata, con un poco de agua me han dado un xuso tan bueno como el de la Cochinilla de Sta. Catalina y se cria en las Fumar. opales. silvestre y que he recogido en la corte de aquella Villa.

Mayo 16

Guaianum

Statice Guaianum - Scapo paniculato tereti, lev.; foliis ob-
ovato-spatulatis, emarginatis, subvenosis, floribus secundis, pa-
nicula ramis teretibus.

sp. n.

En la costa de la mar y la he visto en B. L. en los Pu-
trados del D. Segurolo: las raíces permanentes, pardas leño-
sas: las hojas radicales robustas, lampiñas, enteras, sin venas
debajo sin venas que se ven algo p. encima obtusas y ca-
si spatuladas que se estrechan mucho formando un
buen pedicelo de casi una pulgada termina en las 2 alas
mas. El escapo desnudo, rollizo, pardo: la panícula
abierta con los ramillos llenos de flores blancas y
miran p. arriba. Sirven p. afirmar la dentu-
rada y de tener los flusos &c.

Clematis de Maldonado

Clematis Maldonadensis - foliis ternatis ovatis, acutis
integerrimis, caule scandenti, tereti, floribus axilla-
ribus solitariis pedunculatis.

Con dificultad he puesto este caracter, pues es plan-
ta que cogi en Maldonado hace 16 años y esta-
ba en mi herbario casi enteramente perdida.

Apuntes sacados del Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle.
appliqué aux arts &c. Paris 1816.

Animal - un cuerpo organizado, sensible, voluntario. ^o ~~racional~~ ^o ~~racional~~, provien-
to de un órgano central de digestión.

Sobre estos principios esenciales y característicos se debe establecer la cla-
sificación y distribución de los animales. La sensibilidad y sus efectos, a sa-
ber la movilidad espontánea y la digestión central; no el corazón, ni el apen-
daje oído, ni la forma de los miembros, suministran los principios sufi-
cientes p.^a graduar los animales; ellos no indican la cantidad de
animalidad que entra en cada clase ni en cada familia. Es preciso
que en cierto modo, el método de clasificación sea un termómetro,
es decir, una medida de los grados de animalidad, como el thermome-
tro indica los grados de calor.

Las partes mas esenciales a la vida animal se encuentran en el
sistema nervioso o en los nervios. Como ellos son los primeros órganos
del sentimiento, son tambien la raíz de la animalidad. Sentir es tener ner-
vios, es ser animal. Quanto el sistema nervioso es perfecto, otro tanto es mas
nervioso y esta mas elevado en la escala de los animales. El sistema
nervioso pues, se debe establecer las primeras y ~~mas~~ principales divisiones
del Reino animal. Los cuerpos organizados insensibles son las plantas -
los cuerpos organizados sensibles son los animales.

Se principiara la marcha filosofica de los mas simple a los mas com-
pleto. Es facil distinguir los dos sistemas nerviosos, por el cerebral no se halla sin iguales
oído, y el linfático sin canal intestinal y esta provisto de gangliones y nervios: las molé-
culas nerviosas en los demás, pues siendo sensibles deben participar del sistema nervioso.

Animales.	Dos sistemas nerviosos el celular y linfático.	Sangre calida.	Hombr o mamíferos
		Sangre fria.	Reptiles Peces
	Un sistema nervioso, rodeando al esófago: el sistema linfático	que tiene un corazón y dos branquias.	Molluscos, conchas Helminthoides Cirrhipedus Crustaceos
		sin corazón y con traqueas y pulmones agua	Arachnides Insectos Vermes anélidos e intestinales
Moléculas nervi- osas, zoophytos.		Strobilarios.	Soziales, Botryllos &c.
		Phanerogams.	Echinodermes Polipos e hidras
		Coralligenas.	Corales y cementophytos Chadraporas y esponjas
		Microscopios.	Infusorios

Ancistrum. a los generos deben llamarse los generos et cetera y
el *Margayricaptes* que trae la Flora Pennana por que el numero de
los cráneos varia de 2-4: a lo menos son generos no sufi-
cientem^{te} distinguidos. (Beauvois Dicc)

Canna. *Balisier* - se come su raíz cruda y cocida: de sus cañas se han
cen hilos en Philipinas p.^a fabricar telas de color de Chanki por q.^a
siempre conservan su color y asperea, y se les llama Nippi.

Chat. *Felis*. *Yaguaroti* de Strabo. - Grand chat fauve, à taches en
forme d'oeil, rangées sur quatre lignes de chaque côté. Cuvier
Le Jaguar, *felis onca* Linn.

Jaguar noir de Marcgrave seroit au dire de cet auteur le tigre
de un Veau d'un an et constitueroit peut être un nouvelle espece. y
unade que n'ignorem *Wagero* *W. naturalium* *W. hablas* *W. des* *W. de*
Leopard. Cuvier Grand chat fauve, avec de taches en rose beaucoup
plus nombreuses que celles de la panthere, au moins au nombre de
six par ligne transversale

- *Chitigonazon* *Felis pardalis* - Gato de mediana talla, grisâtre à ta-
ches larges, réunis en bandes longitudinales fauves, bordées de noir: y
siempre se confundoia con el ocelot hasta que Cuvier la ha caracte-
rizado bien.

2.^a especie del Dicc. Cougar *Felis concolor* Linn: sui manchas grandes
chat fauve sans criniere, ni flacon au bout de la queue. Cuvier
10. especie *Felis melan* - Chat de moyenne taille, à pelage noir, mar-
qué de taches plus noires en core. Peron. fue enviado de Java a la
emperatriz *Therapsina*. El Jaguar negro no puede colocarse en esta
division por ser de talla grande y una variedad del mismo tigre.

21. Margay *Felis tigrina*: *maulio* *F. ocelot*, at nigri et non ful-
vis nigro marginatis
22 *Felis passer* (*fasciatus*) Dicc.

Nº 24 del 8/8.

Genus novum de los Phalangita.

Car. oculi 2 thoracis medio subseriles, parum ^{distantes} ~~mand. brevissimi~~
palpi, ~~mandibulae~~ ^{mand. brevissimi} ~~corpo dimidio breviores~~; ~~pedes~~ ^{postici} ~~longiores~~; ~~omnes~~ ⁹⁻⁸ articulati: abdomini
parv antica lata marginata, semicirculari.
corpo ovali

Femora 4 lineas de largo y los pies posteriores que son mas
largos y robustos con dos aguijones en su base veran
apenas la mitad mayores que el cuerpo: los otros
veran poco mas largos que el cuerpo: se encuentra
bueno las piedras: es lampiño menos los tarsos.

Genus novum de la misma familia

Car. oculi 2 thoracis medio subseriles aculeos inter
posito: palpi, ~~mandibulae~~ ^{mand. brevissimi} ~~corpo dimidio breviores~~; ~~mandi-~~
~~bula brevissima~~: ~~pedes~~ ^{postici} ~~longiores~~ ^{longiores}
~~submutici~~: ~~omnes~~ ⁶⁻⁷ articulati: abdomine
rotundato, postice truncato.

Es doble mayor y mas obscura: cuerpo comprimido
como la otra: los pies posteriores mayores, y con
aguijones poco notables: en el mismo lugar
de mi quinta

Nº 24 Grillo

Gryllus - (sect. 1.) ad Gryllum campestr. — niger nitidus:
femoribus fuscis: antennis utraque corpore longior
2ibus: articulo 2º posticorum suboboleto.

Sangonia
Corydium (II. 4. A. 2.) con el tantanico. ~~fusca~~ ^{palide}
~~virescens~~: ~~lirio reticulatum~~: femoribus, postici mar-
gari tacei: carina thoracica subflua.

f. n. (caraborum) elytris tibiisque anticeis inte-
grisi: thorax subrotundatus capite latior: mandibu-
lis subintegris: palpi maxillares capite lon-
gioribus: articulo ultimo obconico: antennae filifor-
mes, articulis cylindricis, tertio longiori: articu-
lis 1. 2. 3 pedum ~~primis~~ anteriorum et secundorum
pulverinatis aut pillosis.

Niger. supra cupreus striato-punctatus.
Tomado en un madero donde estaba medio en-
terrado

Coccyzus macrocarus. Nisa castanea en Brasil.
Cuculius cayanae.

Coccyzus tringarius et (Tringa vulgar)

La tringa en Panayro y tiene en largo mas de 18 pulg.
incluyendo el pico en 16 lin. y la cola de 10 pulg.
la menor tiene 9½ pulg. color por encima castaño,
que es el mismo sobre las alas y cola: sobre los cost-
dos del cuello por debajo del cuello y pecho ~~tan~~
rojo mas claro: el resto q. debajo ceniciento y pasa a
negro sobre el ano: el pico amarillento en la punta
y de azul obscuro el resto: los remos negrean en
la punta: y las quías menores ~~son~~ terminan en blan-
co y negro: siendo algunas las minimas casi negras
por debajo: el iris rojo?

N.B. Se halla en esta Campaña y es comun en
Atrevingua.

1. collar rojo con los. costados del mismo color. y
fajas negras con los extremos azules. 187
91
- No es común es del tamaño de la culebra; tiene
9 espinas en la cabeza y colmillos: color perla
por debajo
- 2.ª cola G. debajo colorada con una línea longitudinal
de Virgulas en el dorso y otra lateral amarilla-
blanca por debajo. 188
64
- macho: cola aguda — común de negro
- 3.ª cola amarilla y manchada G. debajo del cuer-
po: por encima negra con líneas amarillas
encadenadas: cola corta 191
90
- hembra.

N. 26. Dormilon

Caprimulgus Naucunda et rana, et Scilloz. dice. h. n.

colloque
Supra, lineis transversis angulatis alternis nigris et griseis
maculisque nigris laxis, rubris albus Ictis transversis
~~nigricantibus~~ & Remigibus primariis nigris, medio
albo fasciatis mi guloque fascia alba.

Tiene de largo $11\frac{1}{2}$ pulg. ing: la cola 7. pulg. el pico
16 líneas: las narices ovales, tubuloras: las cejas negras
cortas y plumosas: el pico negro como las uñas: los pies
desnudos y carnosos: la uña del medio aserrada, una
con 7 y otra con 9 y 5.º diente el mayor: la cola tiene
por encima tres fajas negras mas notables: las alas
sobre pasan la cola: la 2.ª pluma del ala es mas larga.
Se advierte solo, el Vexano: anda al caer la tarde y
pares y en piquetas bandada en lugares abiertos
en el campo, y al medio dia se despan acercar de modo
que este lo mató mi negro con la arada en el camino

Rana (bufo) oculata - supra terri oculis nigris ta-
 ria linea ^{dorsali} longitudinali alba; subter granulosa
 alba immaculata: palmis fissis tetradactylis, plan-
 ti subpalmatis subhexadactylis.

Lo tomé en mi Quinta que estaba baxo de tierra al
 medio día: tenía pulgada y media de largo y poco
 menos de ancho: los brazos tendran media pulgada
 y las piernas el duplo. Las manchas son de color
 terreo negroceo bordadas de blanco: tiene baxo en
 polico un callo o uña en las plantas en forma
 de xifon: tan grande como el pulgar: el 2.^o exterior
 es el mas largo de todos. Es el primero que
 viste, aunque los negros cabadores me dicen que
 no son raros los que salen quando caban.

N^o 27 Araña grande Minera

Mygale horridum (aranea Sim.) nigra pirsutum
 nigrum thoracis marginibus glabrescentibus abdomi-
 ne pilis rubris: — tarsi nigris, scapula nulla.

Piojo del Caballo. N^o

Pediculus equinus - segment thorace segmentis
 tribus equalibus distinctis corpore ovali crenulato
 fuscicenti: pedibus validis: antennis rotto antennis
 longiori.

En el caballo se pelo y sobre la piel del lomo
 y me dijeron que eran piojos: y observe el
 anterior: lo bañe en agua valada y está
 mejor.

Champi-

Pertenece al genero *Frox* de los escarabajos, y tiene el habito del *Fr. sablonens* y *Fr. granuleus* en la Pl. 153. fig. 2 y 4 de la Encic. de Olivier.

El 2.

Macran

Scorpio ^{niger} ~~obscurus~~ ^{fulvus} ~~glaber~~
oculis, 8. pectine 18 dentate: cauda
^{longior} articulo ultimo scabro: pollice
ovato lev.

Se ven los ojos marginales con dificultad: por lo demas vean la descripcion primera

El 3. Lang. cornuda

Trixalis acutus - antennis 7 articulis cornu am-
plissimo brevioribus:

Las antenas tienen 7 articulos sueltos fuera del comun: el cuerpo ^{no} es tricheto, y los ojos quedan en el medio: hay una canal p.^a cada antena: su color de gris rojizo: tiene de largo 2 1/2 pulg.^{as} las pies posteriores debiles y cortos a proporcion de los de la familia, en la *Linneta* (no tienen alas)

N.º 2

Langusta de capilla.

Acrydium: monachus Vixidis: antennis sulfi-
 formibus 20-articulatis: thorace carinato, por-
 terius nimirum producto dentato lobato: pedibus por-
 ticiis femoribus sinuatis - ~~en la Quinta~~

En la Quinta muy grueso y rugoso de pe-
 co mas de pulgada: participa del Grillon ele-
 phant y de le Naturelle Epinnese de Oliver
 en su Enciclopedia: Las antena poro
 menores que el torax - En verde ~~verde~~ y p.
 rebasa a maxilla.

N.º 2. abispilla

Simps. senecii - niger, antennis pedibusque rufescenti-
 bus: abdomine minimo sub ^{pediculado} globoso: thorace maximo an-
 tennis ipso brevioribus. ~~Parsequen~~ Latreille

Es insecto de poco mas de una Negro nota claramente
 forrado: alas aqueas immaculatas: se hallaban
 Ranos pegados al caliz de una flor de un senecio
 pinatifido en mi Quinta. ~~Torre~~ Antenas
de 9 articulos

Pl. 9

12

Tarantula
Sycora ^{bicolor} ~~radiata~~ ^{nigra} - thorace maximo depresso al-
 bo marginato, radiatoque: nigra abdomine ovali
 minori vittis albis.

Se encuentra en la quinta capa de tierra por
 los cabudores: es temerosa negro y blanco: los
 pies largos, gruesos con ~~los~~ anillos negros: los pal-
 pos largos y las mandíbulas de tomento blanco:
 las hay de cerca de pulgada: el dorso elevado

Pl. 9. de 10 pies.

Genero nuevo? robusti.
Equipoda - oculis :: pedibus brevibus & longioribus, pri-
 mi deinde palpi aequalibus. thorace maximo obovato
 abdomini globoso molli & subaquali: maxilla ciliata
 convergentes: labium parvum trigonum.

Se encuentre en el mismo lugar que la otra:
 tendrá ~~media pulgada~~ 9 líneas de largo: los pies
 posteriores $\frac{8}{10}$, los anteriores $\frac{7}{10}$ y los palpos $\frac{6}{10}$. Su
 color es pardo obscurovelloso y el tórax lampiño:
 Podría llamarse Decapoda.

Pl. 9.

Altica rubricollis - nigra: elytris margine albis
 thorace rubro, ~~media~~ Centro nigro.

En las plantas oblongas acoradas: las antenas llegan
 a la mitad del cuerpo: hembra tendrá 3 líneas.

N. 5

Pyrrhistis. 8-punctatus - rubro cuprea: antennae rarisq^{ue} nigris, abdomine rubro ad latera utrinque punctis 4 villos albidis. Excavellata, thorace postice lobato: elytris integris ~~ant~~ trilinearis.

N. 6 *Abispa*

Synagris tectorum, - nigra, abdominis segmentis margine flavis, alis ferrugineis: abdomine breviter petiolato.

Se anida en los techos q. dentro con barro: suelen tener como una pulgada de largo alto irregulares informes de diámetro q. como tres pulgadas y está este barro taladrado de varios agujeros segun me lo ha parecido desde abajo. 8 lineas de largo

N. 7 *escarabajo de agua*

Hydrophilus fuscipes. - iterno postice retrorsum in epinotum productis: ~~pedibus~~ niger, antennae, pedibusque fuscis oblongis ovali - thorace transverso: antennae capite longioribus.

Se cria y nada en las aguas principales. Se encuentran: tendra 4 lineas. El 7.º artículo es muy grande y caberón.

IX 9

12

Sycora ^{bicolor} ~~radiata~~ ^{nigra} *Taxantula*
 Thorace maximo depresso al-
 bo marginato, radiatoque: nigra abdomine ovali
 minori vittis albis.

Se encuentra en la Lunita bajo de tierra por
 los cabadores: es tomentosa negra y blanca: los
 pies largos, gruesos con los anillos negros: los pal-
 pos largos y las mandíbulas de tomento blanco:
 las hay de cerca de pulgada: el dorso elevado

IX 9. de 10 pies.

Genero nuevo? robustis
Equipoda - oculis ... pedibus brevibus, 4th longioribus, pri-
 mi deinde palpi aequalibus. Thorace maximo obovato
 abdomini globose molli & subaquali: maxilla ciliata
 convergentes: labium parvum trigonum.

Se encuentra en el mismo lugar que la otra:
 tendrá ~~media pulgada~~ 9 líneas de largo: los pies
 posteriores $\frac{8}{10}$, los anteriores $\frac{7}{10}$ y los palpos $\frac{6}{10}$. Su
 color se pardo obscurovelloso y el torax lampiño:
 Podría llamarse *Decapoda*.

IX 9.

Altica rubicollis - nigra: elytris marginibus albis
 thorace rubro, medio Centro nigro.

En las planuras oblongas acoradas: las antenas llegan
 a la mitad del cuerpo: hembra tendrá 3 líneas.

14

Opatro uel Fenebriones

Pl. 9

Opatrum brevicorne - antennis thorace breviori-
bus nigricantibus ^{glabris} ~~subtus~~ ^{subtus} digitis ~~furcatis~~ elytris stria-
tis alatis.

Se encuentra en lugares oscuros y tendra en
largo media pulgada: doble del sablunoso de
Olivier; pero las antenas son al doble mas cor-
tas. El ultimo articulo de los palpos es no-
tablemente mas ancho.

Araña aquatica Pl. 9

Tetranychus ribularis - oculis - pedibus primariis
longioribus, eorum cruribus thorace ~~duplo~~ longioribus,
brachiis, dorso albido sericeo, thorace pedibusque rubescen-
tibus.

La encontra en el arroyo de mi Quinta en cuyo fun-
do habia tendido una red ^{vertical} obliqua y pillado alg.
aquaticas ^(agnones) ~~perlas~~. Su abdomen es linear, lo mismo
que el torax: este es doble mas corto y las mandibulas
que son espinosas p. dentro son casi iguales a este linea-
res. La longitud de las piernas guarda este orden 1. 2. 4. 3
estos son muy pequeños.

Agrius horizontalis - alis horizontalibus!!!

labro, oculis, thoracis, abdominisque lateribus ceruleis, linea dorsali nigricanti, subtus pedibusque flavicantibus.

Ferrón de largo poco más de pulgada y media: hoy eran muchos al caer la tarde que se pegaban a los árboles fijándose en ángulo recto con el abdomen, y quedando sus alas perfectamente horizontales, como lo observé en todos: en lo que se diferencia de su familia y de otras especies que hay. *A. acia*: en lo demás el labio tiene las tres divisiones y la del medio mayor y partida los ojos prominentes y separados: los ocelos en triángulo y el cuerpo muy atenuado y linear. con toda la apariencia de un *Agrius*: los estigmas pardos.

N. 15.

Otro *Aguacid* grande común

Echna precursor - oculis contiguis: antennis 6-articulatis.

Tiene todo el aspecto de este género: la cabeza redonda: los ocelos en una línea transversal: el abdomen linear: las alas horizontales. La división intermedia labial grande, casi igual, entera y redondeada: las maxilas con 4 dientes poderosos. V.

N. 14

Cerambyx mollis, — sect. VI. (Clytus Fabricii)

niger, pubescentia alibicanti; antennis corporis
dimidio brevioribus, pedibus clavatis, elytris mo-
nibus.

Tendra una pulgada: es perfectamente negro, pero
se advierten algunas virgulas blancas 2
principalmente sobre las elitras que las forman
una especie de tomones. Las elitras son suave-
blemente blandas y cubren todo el cuerpo.
Quando lo agarran estira otro tanto casi q.
el cuerpo el ano con dos unidades en el extremo.
Fue pillado en el Tardín de casa.

N. 14

Harpalus ~~serotocissimus~~ — I. 1. B. niger, pedibus
palatis, elytris striatis

17

Lagartija color arenatus,

Scincus. trivittatus. Supra griseus Vitis tribus ni-
gris, subtus albus, gutture ~~aurantio~~ rubescanti.
Squamis superioribus carinatis acuminatisque, inferio-
ribus latis, capitalibus ~~striatis~~ ^{portatis} scutellatis, stric-
tisque: digitis ^{longioribus} ~~valde~~ inaequalibus, cauda brev-
tereti, crassaque.

Longit. totalis $4\frac{1}{4}$ pollices.

Capiti. $\frac{7}{10}$

cauda. $1\frac{8}{10}$

pedum dist.^a. $1\frac{4}{10}$

2^a inter. reliq. longior. $\frac{2}{10}$

+ Las escamas imbricadas redondeadas y grande-
citas: las caudales mas estrechas y se distinguen
muy bien de las dorsales que son pequenissi-
mas, no obstante que cubriene con ellos en
la forma de los dedos y pies: cuello corto

Corvinata Ham-
ca.

Pexco

10, $\frac{1}{29}$

18

Dorso monopterygio, conda indivisa,
argentea, dorso et capite f. v. s. auro. B. 7. D. 10. P. 16. V. 1. A. 1. C. 15
40 6 8
mixti. pinnis parvis. Macula fusca
notatis, ventralibus et analibus parvis.

Caput obtusum, declivum, scamnotum, oculi
linea de lutea, inter eos sula duo, os me-
diane, faucibus dentatis, mandibula v. s. auro
brevior, dentes exiles, opercula
triplici lamina constat, suprema pos-
teriori denticulata, angula duobus d. h.
maculis praedita: lingua et palatum
tertia, linea lateralis, versus anum
curvata, lapides duo in cerebro: primus
dorsalis primus brevissimus: octo reli-
qui fasciā lineam lateralem transver-
sam et parum notabiliter deinduant.
radii dorsales membrana longioris,
pinna hoc totum dorsum excurrit.
tendra. esta curvatura medio pie de
largo, et tunc un poco me. immedia-
to a la cola, es comprimida y afi-
lada hacia el dorso, latitudine p. oler
cum ferrice, conda integra

Nota Palment u B. V. Tambour trache
una corbina. El Peril con
el sinonimo Labrus eximius.
Nuestra Corbina quando la sacan
del agua se respira formando el
señalo de un tambores

Diciembre 29,

Oruga orla, Pallas, - de 16 pies, quando se estira tiene
unas cinco pulgadas de largo, y gruesa como el pulgar
es jaspeada de negro, y de color de Matron, con dos pun-
tos blancos en el tercer segmento: desnuda, sin cola
y ~~sin~~ ab: los 10 pies membranosos tienen pestañas en
su extremidad; teniendo sobre el ultimo segmento
una mancha ovalar negra, que se estremece con
frecuencia


Jul.
28. J. de P. semil.
Oct.
8. ~~Chelone~~ ~~livid.~~
14. Calixti
10. Chelone




ANGLO



ANGELO







ANGELLO



ANGELO

1824

Dear Sir
I have the honor to acknowledge
the receipt of your letter of the 11th
inst. in relation to the
purchase of a new mill - The
same has been forwarded to
the proper authorities for
their consideration and
I am sorry to hear that
they are not yet decided
in favor of the purchase
of the same.

20

Año 1824

Este Año ha sido mucho y largo
los frios. Y con este motivo se crea
que la Mercuria en todos estos
días en un solo día en Agosto
ha llegado a tres mil - En este
mismo mes es tan abundante la
pesca de perreyes, que todo el
pueblo está ocupado en esta diversión
en los contramuros.

Medidas del Chataco

	pulg. lin.
De la punta del hocico a la punta de la cola . . .	22 0
La cabeza	3 6
Cola	3 4
Oreja eliptica	1 3
Grupa	7 0
Canso anterior	3 3
Tasas movibles duplicadas. cada una	1 4
Del hocico al ojo que no tiene pestañas	1 4
Del la punta de la cabeza ala entrada de sueno	0 7
Diámetro del hocico	0 7
Cerrado circunferencia Medida G. delante	19 6
Cerrado idem por el centro	19 6
Fibia y tarsos posteriores	4 0
Braço desde el extremo de la uña al codo	3 6
La hendidura de la boca	1 2

Cher Jean et Charles

Mais pour ne pas vous ennuier

Je ne vous envoie

rien

de bon

pour

le moment

car je suis très occupé

de mes affaires

et de ma santé

qui ne va pas très bien

à cause de la pluie

et du froid

Je vous embrasse

très tendrement

et vous prie de

me répondre

à votre prochain

avis

Je suis, cher Jean,

avec vous

de tout cœur

et de tout

mon

affection

et de tout

mon

respect

et de tout

mon

amour

et de tout

mon

devoir

et de tout

mon

devoir

22

Para curar = Le usa de la cascara del Molle del dulce
 del Guayabo q. es la principal, y tambien
 de la America. El dancetina le da chicha y morado
 Piley hay mejores para botar son ley de Pernado, y el Gran
 Zumbira

Amazilla Las raíces del Palo conocido p.^a raíces
amazillas, á las Barbas. También
con los Macactines ó Oxalide. Con
el Azapán y la tierra ó el cantamo
ó Alasol

Fringilla cirica Chingolo
Senecio magnifolius et alia
Pharmanellus Micro-petalus
Lycopus spatulatus Cereyamillo
Stranva Phorace
et alia Cidantillo
 + Genus novum *Condillo affinis*
Pera cyrasta Passiflora
Nicotiana latibata Lerbade Tm
Anthemium diffusa Manra nilla cimarum
Anthemium ascendens Manra nilla f. Medionda
 + Genus novum *ellampodio affinis*
Scolymus hispanicus
Papilio cupreiventris blanda
Dytiscus Maximus
Hydrophyllum Maximus
Helix tetragona planorbis
Helix bonasensis planorbis
Papilio Aurantia blanda
Papilio Argentea
Papilio sanguinea blanda
Tern. subagrorum - Cambuchi
Tern. glaucum - Arumilla
Tern. suffruticosa Pyritus
Marmor Vulgatum pidaude cal
Syphe longifolia. Fozera
Plumbum galena
et alia atramentum
patu pellucidum
Feldpatu Vulgare
Quartzum et m. thytus

Indice del m.

24

Genus —

- Buprestis. Polilla orla maderana*
Phitolaca dioica - Trombii.
Cantharis
Chenopodium - Payson
Coccinella - Vaginita or S. Antioch
Pezizia - Payson. Genus novum
Pezizia bilabiata
Coccinella aureo-marginata
Meloe canstica - Vaginita
Athexina regia - Perceps
Zeni - Palometa chica; Cherodon?
Stromateus argentinus - Fitola.
Verbena parviflora
Cuxculis nitidioris
Hypericon perfoliatum 1m
Tulus bicolor - Cienpies
Gomphrena genus reformatum. Siempreviva
lanceolata
Pteris
maxima
Actinoptera radicans.
Amphisbena bicolor - Tibora bota (man.)
Libellula magna - Aguacil.
Statice Guadalupe - Statice timoniensis. Linn?
Convolvulus inaequalis - Campanillas
Stromateus immaculatus - Palometa nata
Cuplea Laccia - Lacha
Cuplea argentina - Sardina
Tetradon munnoxi - Tambor
Dichondra repens. etrogillo.
Manti mamboxeta.

Viage a ...

Araucaria ...

Scarabeus fodiens

Lanius Pintagua - Piñetero.

Eleater noctivagus. Pichu es luz en la cabeza.

Hippomane Fratum - Palo de leche. Curupica.

Canna lutea. Cuentas de ...

Cavia aperca

Castor Arariu - Quia - Nutria

Capibara Cavia Capybara

Cavia Para - Pai

Cavia Aguti - Aguti

Fapiti - Lepus brasiliensis - P. Fapiti

Lepus viscaccia - Vizcachas

Lepus patagonica. sp. nov. infide Arara

Hystrix prehensilis - Cuiy

Loxia bonariensis - Narangero

Coccinella cantanea - Cochinilla color saucer?

Erigeron domesticum

Plenconetes minimus. Lengua dito. Acceria.

Plenconetes Montevideus - Lengua d

Silurus Montevideus. Bagre amun (imperf)

Muscicapa Tyrannus - Fipera

Mylla torum - Caraiotto en la fuente

Suplemento y correcciones.

Observac. Meteorologica

Medica.

75

DEFECTION

DEE ERNIE





ARCHIVO Y MUSEO

HISTORICO NACIONAL

